

BULETIN DE AVERTIZARENr. 2 din 18 FEBRUARIE 2025

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

..... BOLI / DĂUNĂTORI SOL

care poate cauza pierderi importante la cultura: LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE / CÂMP,
DIFERITE CULTURI CÂMP

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA PREZENȚEI AGENTULUI DĂUNĂTOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. COROCID SUPER

Cultură RO	Agent dăunător	Nume RO	Doză
tomate	dăunători	coropisnita	20 kg/ha

sau

2. BASAMID GRANULE

Cultură RO	Agent dăunător	Nume RO	Doză
legume din solarii înfiintate prin rasad	Dăunători	coropisnita	250 kg/ha
tomate sera	Boli	mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare
tomate sera	Dăunători	nematodul galicolic al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare

sau

3. RAISAN 51

Cultură	Agent dăunător	Nume RO	Doză
dezinfecția solului în sere	Boli	Fusarium sp. (fuzarioza), Phytophthora sp. (mana), Verticillium sp. (ofilirea vasculara)	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat
dezinfecția solului în sere	Dăunători	Meloidogyne sp. (nematodul galicolic al radacinilor)	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat
dezinfecția solului în sere	Buruieni	buruieni anuale si perene	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat

sau

4. TRIKA EXPERT

Cultură	Agent dăunător	Nume RO	Doză
ardei, tomate, vinete, salata	Dăunători	buha semanaturilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-16)
cartof	Dăunători	buha semanaturilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu plantarea (BBCH 00)
castraveti, dovleac, dovlecei, pepeni	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
culturi semincere (varza, cucurbitacee, salata si alte semanatoare, porumb, rapita, morcov, cartof, solanacee)	Dăunători	buha semanaturilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00) sau odata cu plantarea (BBCH 12-14)
floarea soarelui	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
morcov	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
pepiniere silvice, floricultura si plante ornamentale	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul/plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
porumb, mei, sorg	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
porumb, mei, sorg	Dăunători	viermele vestic al radacinilor	12-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
rapita, soia	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)
varzoase pentru capatana si inflorescenta	Dăunători	buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)

Perioada optimă de tratament: LA PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV,
SAU LA SEMANAT, PLANTAT ÎN FUNCȚIE DE CAZ.

Alte recomandări:

SE VA RESPECTA CU STRICTETE TIMPUL DE PAUZĂ DE LA APLICARE
PÂNĂ LA SEMANAT / PLANTAT, ÎN FUNCȚIE DE INFORMAȚIILE
SPECIFICATE PE ETICHETA PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR UTILIZAT.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipienții și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA - ROSICA *Nartic*
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Coordonator Oficiul Fitosanitar Bacău,

Zaharia Gheorghe

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.