

BULETIN DE AVERTIZARENr.....9.....din.....20 MARTIE.....2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

FĂINARE (SPAEROTHECA MACULARIS); PĂTAREA ALBĂ (MYCOSPHERAELLA FRAGARIAE); PĂTAREA PURPURIE (DIPLOCARPON EARLIANA); PĂTAREA BRUNĂ (DENDROPHOMA OBSCURANS); ANTRACNOZA (COLLETOTRICHUM FRAGARIAE); ALTERNARIA SP. ; PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS CINEREA) PĂIANJENUL CĂPȘUNULUI (TARSONEMUS FRAGARIAE)

care poate cauza pierderi importante la: **CĂPȘUN**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

FĂINAREA - PE ORGANELE PLANTELOR ȘI ÎN SPECIAL PE FRUNZE, SE FORMEAZĂ PETE PÂSLOASE, ALBICIOASE, USOR GĂLBUI, CARE MAI TÂRZIU DEVIN PRĂFOASE. FRUCTELE VERZI ATACATE NU SE MAI DEZVOLTĂ SAU SE DEFORMEAZĂ ȘI CRAPĂ.

PĂTĂRILE - SE MANIFESTĂ PRIN APARIȚIA UNOR PETE CIRCULARE DE 2-3 MM, PÂNĂ LA 3-5 MM PE LIMBUL FRUNZELOR ȘI UNEORI PE PEȚIOL ȘI PEDUNCULI, UNDE APAR PETE ALUNGITE. LA ATAC PUTERNIC, PETELE SE UNESC IAR LIMBUL FRUNZEI, SE USUCĂ.

ANTRACNOZA- AFECTEAZĂ COLETUL, FRUNZELE, MUGURII FLORALI, FLORILE SI FRUCTELE.

PUTREGAIUL CENUSIU = AFECTEAZĂ TOATE ORGANELE VEGETATIVE, DAR CELE MAI SEVERE ATACURI SUNT CELE DE PE FLORI ȘI FRUCTE; FLORILE ATACATE SE BRUNIFICĂ; FRUCTELE SE INMOAIE ȘI APOI PUTREZESC COMPLET;

PĂIANJENUL CĂPȘUNULUI- IERNEAZĂ ÎN MUGURII FLORALI ȘI ÎN FRUNZELE DE LA BAZA ROZETEI. ARE 5-8 GENERATII/AN. LARVELE TINERE ÎNȚEAPĂ ȘI EXTRAG SUCUL DIN ȚESUTURILE TINERE CARE SE ÎNGĂLBENESC, SE GOFREAZĂ, SE BRUNIFICĂ ȘI APOI DEVIN CASANTE. PLANTELE ATACATE STAGNEAZĂ DIN CREȘTERE ȘI PRODUCȚIA SE REDUCE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

DUPĂ IGIENIZAREA CULTURII

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

CIDELY TOP= 1 L/ HA + PROLECTUS =1,2 KG/HA

Perioada optimă de tratament:

DUPĂ APARIȚIA PRIMELOR FRUNZE TINERE ÎN MIJLOCUL ROZETEI

Alte recomandări:

PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL SANMITE 10 SC/ (NEXTER) - 1,5 L/ HA

Măsuri preventive:

*** UTILIZAREA DE MATERIAL DE PLANTAT CERTIFICAT, PROVENIT DIN PEPINIERE
AUTORIZATE, ÎNSOȚIT DE PAȘAPORT FITOSANITAR LA ACHIZIȚIONARE**

*** COMBATEREA INSECTELOR VECTOARE (VIROZELE SUNT TRANSMISE DE AFIDE, CICADE SI
NEMATOTII DIN SOL);**

*** TRATAREA SOLULUI ÎNAINTE DE ÎNFIINȚAREA CULTURILOR;**

*** ELIMINAREA PLANTELOR BOLNAVE DIN CULTURA SI DISTRUGEREA PRIN ARDERE.**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

VARTIC MIHAELA - RODICA


Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.