

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.17..... din 14 APRILIE.....2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

FĂINARE (SPAEROTHECA MACULARIS);
PĂTAREA ALBĂ (MYCOSPHERAELLA FRAGARIAE);
PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS CINEREA)

care poate cauza pierderi importante la: CĂPȘUN

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

FĂINAREA - PE ORGANELE PLANTELOR ȘI ÎN SPECIAL PE FRUNZE, SE FORMEAZĂ PETE PÂSLOASE, ALBICIOASE, USOR GĂLBUI, CARE MAI TÂRZIU DEVIN PRĂFOASE. FRUCTELE VERZI ATACATE NU SE MAI DEZVOLTĂ SAU SE DEFORMEAZĂ ȘI CRAPĂ.

PĂTĂREA ALBĂ - PE FRUNZE SE OBSERVA SUB FORMA UNOR PETE DE 1-5 MM DIAMETRU, CU MARGINEA PURPURIE (ROSU-VIOLET) IAR CENTRUL PETELOR ESTE CENUSIU-ALBICIOS

PUTREGAIUL CENUSIU = AFECTEAZĂ TOATE ORGANELE VEGETATIVE, DAR CELE MAI SEVERE ATACURI SUNT CELE DE PE FLORI ȘI FRUCTE; FLORILE ATACATE SE BRUNIFICĂ; FRUCTELE SE INMOAIE ȘI APOI PUTREZESC COMPLET;

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

ÎNAINTE DE ÎNFLORIREA ÎN MASĂ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

ORTIVA TOP/(SIMPLA) = 1 L/ HA + SCALA= 2 L/ HA

Alte recomandări:

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (Ph cuprins între 7-8);