

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.....19.....din.....14 APRILIE.....2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere □solarii□răsadnițe□, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

FAINAREA (UNCINULA NECATOR)
ACARIANUL ROȘU COMUN (TETRANYCHUS URTICAE)

.....
.....
care poate cauza pierderi importante la cultura **VITA DE VIE**
.....

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

FAINAREA : SE MANIFESTĂ PE LĂSTARI PRIN APARIȚIA UNEI PÂSLE FINE, CENUȘII CE FORMEAZĂ PETE NEREGULATE, CARE APOI SE BRUNIFICĂ. FRUNZELE ATACATE NU MAI CRESCE ȘI RĂMÂN FIXATE PE LĂSTAR. PE AMBELE FEȚE ALE LIMBULUI APARE UN MICELIU ALBICIOS CU ASPECT PULVERULENT.

ACARIANUL ROȘU COMUN: ÎN URMA ÎNȚEPĂRII ȘI SUGERII SEVEI APAR PE FRUNZE DECOLORĂRI SUB FORMA UNOR PETE, LA ÎNCEPUT GALBENE, APOI ROȘII ȘI BRUNE. TREPTAT FRUNZELE ATACATE SE USUCĂ ȘI CAD. ATACURILE PUTERNICE POT PRODUCER DEFOLIERI TIMPURII ALE BUTUCILOR CU CONSECINȚE NEGATIVE ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI MATURIZĂRII COARDELOR

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

INFRUNZIT- STADIUL DE LASTARI CU TREI FRUNZE DESFACUTE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

KUMULUS DF = 0,3% + NISSORUN 10 WP - 0,5 KG/HA

Alte recomandări:

.....
.....

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;