

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 37 din 22 Mai 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

MANA (PLASMOPARA VITICOLA)
FĂINAREA (UNCINULA NECATOR),
ACARIENI (TETRANYCHUS URTICAE, PANONYCHUS ULMI)
MOLIE (LOBESIA BOTRANA) GII

care poate cauza pierderi importante la cultura **VIȚA DE VIE**
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

MANA VITEI DE VIE: ATACUL SE MANIFESTA PE TOATE ORGANELE PLANTEI. PE FRUNZE APAR PETE GALBENE (UNTDELEMNII), DE 1 - 3 MM. FRUNZELE ATACATE DEVIN BRUNE SI SE USUCĂ.

FĂINAREA: SE MANIFESTĂ PE ORGANELE VERZI ALE PLANTEI: FRUNZE, INFLORESCENȚE, LĂSTARI, CIORCHINII, PRIN APARIȚIA UNEI PÂSLE FINE ALB- CENUȘII ȘI POATE ACOPERI ÎNTREG ORGANUL ATACAT.

ACARIANUL ROȘU COMUN: ÎN URMA ÎNȚEPĂRII ȘI SUGERII SEVEI APAR PE FRUNZE DECOLORĂRI SUB FORMA UNOR PETE, LA ÎNCEPUT GALBENE, APOI ROȘII ȘI BRUNE. TREPTAT FRUNZELE ATACATE SE USUCĂ ȘI CAD. ATACURILE PUTERNICE POT PRODUCE DEFOLIERI TIMPURI ALE BUTUCILOR CU CONSECINȚE NEGATIVE ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI MATURIZĂRII COARDELOR.

MOLIA: LARVELE GENERAȚIEI I ROD BOBOCII FLORALI ȘI INFLORESCENȚELE, ÎN TIMP CE LAVELE GENERAȚIILOR II SI III ATACĂ BOABELE ÎN CREȘTERE, ÎN PARGĂ ȘI CELE COAPTE. PE RANILE PRODUSE PE BOABE SE POT INSTALA DIVERSE CIUPERCI PATOGENE CUM AR FI BOTRYTIS CINEREA.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA FORMAREA BOABELOR

PENTRU EFECTUAREA TRATAMENTULUI, FOLOȘIȚI UNUL DIN PRODUSELE SAU AMESTECURILE DE MAI JOS, DUPĂ CAZ :

UNIVERSALIS 593 SC = 2 L/HA + NISSORUN =0,5 KG/HA +KARATE ZEON (NINJA) = 0,15 L/HA

ALTE RECOMANDĂRI:

* TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE

* MONITORIZAREA ATACULUI DE MOLIE A VIȚEI DE VIE SE FACE CU AJUTORUL CAPCANELOR FEROMONALE ATRABOT, TRATAMENTUL ÎNCEPÂND LA CIRCA O SAPTAMÂNĂ DE LA ÎNREGISTRAREA PRIMULUI MAXIM DE ZBOR AL ADULȚILOR.

*** INSECTICIDE BIOLOGICE OMOLOGATE PENTRU COMBATERICA MOLIEI:***** LASER 240 SC/ (NEXSUBA)= 0,15 L/HA - 0,2 L/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8; Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE

nume/ prenume/semnatura/ștampila

MARCELA BOIU



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsul ui agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-fața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.